

Kovin-50

karbamidos szuperkoncentrátum

A kérődzők takarmányozásában az extrahált darák helyettesítésére, pótlására ismét előtérbe került az olcsóbb NPN anyagok felhasználása. A nem fehérje nitrogén (NPN) vegyületek, így a karbamid, nagyon hatékonyan használhatók fel — termelési szinttől függetlenül — a kérődzők takarmányadagjaiban, amikor a fehérjemérleg (MFN — MFE különbsége) negatív, illetve 0 körüli érték. A negatív fehérjemérleg azt jelzi, hogy az optimális bendőerjedéshez a rendelkezésre álló nitrogénhez viszonyítva relatíve sok energia áll rendelkezésre, míg a 0 körüli mérleg azt mutatja, hogy a bendőmikrobák fehérjeképzéséhez a nitrogén és energia arányosan áll rendelkezésre.

Az AGROSZÁSZ Kft. terméke — a KOVIN-50 — olyan karbamidot tartalmaz, amely a bendőben lassabban hidrolizál, mint a granulált karbamid. Ezt a retard hatást az 50%-ban hozzáadott adalékanyagokkal és ezek megfelelő kezelésével érjük el.

A Kovin-50 jellemzői

A KOVIN-50 etetésekor a retard hatás miatt jelentős mértékben csökken a mérgezés veszélye. A lassúbb kioldással jobb a fehérjeképződés és ezt az organikus kéntartalom is elősegíti. Keverőüzemben jól használható, könnyen bekeverhető fehérje-alapanyag, keveréskor nem osztályozódik, jól homogenizálható.

A natur karbamiddal szemben a KOVIN-50 nem nedvszívó. A KOVIN-50 komponenseinek egymásra gyakorolt hatása kedvező és gazdaságos termelési mutatókat eredményez.

A KOVIN-50 táplálóanyag-tartalma a szárazanyagban

Szárazanyag	92 %
Összes NPN anyag	50 %
Nyersfehérje	1500 g/kg %
Energiafüggő metabolizálható fehérje (MFE)	30 g/kg %
Nitrogénfüggő metabolizálható fehérje (MFN)	770 g/kg %
Tejtermelő nettó energia (NEI)	1,8 MJ/kg %
Létfenntartó nettó energia (Nem)	2,2 MJ/kg %
Súlygyarapodási nettó energia (NEg)	1,4 MJ/kg %

Felhasználási javaslat

A Kovin-50 kizárólag keverőüzemi adalékanyagként vehető figyelembe. A nagy koncentráció miatt önmagában nem etethető.

Javasolt keverési arány

szarvasmarha-tápokhoz 2-6%, juhtápokhoz 3-4%

Általában az összes nyersfehérje-szükségletnek hízómarháknál 20-40% -át, Tejtermelésnél 5-20% -át, bárányszoptatásnál 15-30% -át célszerű KOVIN-50-nel fedezni. Szokásos napi dózis 0,4-0,6 g KOVIN/kg testtömeg. Maximális napi dózis 0,9 KOVIN/kg testtömeg. Az okszerűen megállapított mennyiség az adag fehérjeszintjétől, a fehérje lebonthatóságától és a takarmány könnyen hidrolizálható szénhidrát-tartalmától is függ. A kedvező hasznosulás lehetőségét az új fehérjeértékek (MFE, MFN) jól mutatják.

GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ **AGROSZÁSZ Kft.**

Takarmányfeldolgozó üzeme

7349 Szászvár, Külterület 027/9., Pf.:9

Tel., fax: 72/389-516, 72/389-894

www.agroszasz.hu

